

**SANTUARIO DE LA NATURALEZA CARLOS ANWANDTER
HUMEDAL DEL RIO CRUCES
Agosto de 2013**



**Corporación Nacional Forestal
CONAF
Oficina Provincial Valdivia
Región de Los Ríos**

Índice

Capítulo	Página
Resumen	3
Introducción.....	3
Metodología Utilizada	3
Cisnes de cuello negro dentro del Santuario.....	6
Cisnes en áreas fuera del Santuario.....	6
Taguas.....	7
Zambullidores	8
Garzas	10
Cormoranes, Bandurrias y Zarapitos.....	12
Gaviota cahuil, Gaviotín piquerito, Trile y Siete colores	14
Patos.....	16
Otras observaciones realizadas por los Guardafauna	19
Anexos.....	20

Foto portada: Letrero Santuario
Fuente: archivo fotográfico CONAF

Resumen

Dentro del Santuario, la riqueza de avifauna fue de 23 especies este mes, dos más que el mes de julio de 2013. El conteo de cisnes arrojó una disminución en la cantidad de 1898 en julio a 1789 individuos (Anexo 1). La mayoría de los cisnes se localiza en el sector San Pedro (375) . En el censo realizado en áreas aledañas al Santuario, se contabilizaron 214 cisnes observándose la mayor concentración de ejemplares en el sector Pichoy con 111 individuos. La totalidad de Cisnes contabilizados dentro y fuera del Santuario alcanza a 2003 individuos, inferior respecto de julio donde se observaron 2235 ejemplares (Anexo 2).

Introducción

El presente informe tiene por propósito mostrar las estadísticas correspondientes al mes de **agosto de 2013**, recabadas mensualmente por los guardafauna del Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter.

Las estadísticas para un conjunto de aves del Santuario (Humedal del Río Cruces) se entregan en los anexos, y para grupos selectos de aves se presentan gráficos desde enero de 1999 a la fecha.

La metodología empleada se basa en observaciones visuales en movimiento (vía acuática mediante lanchas y vía terrestre en vehículo para acceder a puntos de observación fuera del santuario) y 10 estaciones terrestres ubicadas en posiciones estratégicas para el avistamiento de aves dentro del humedal.

Metodología Utilizada

La metodología empleada en los censos periódicos de la avifauna al interior del Humedal del Río Cruces, cuenta básicamente de dos estrategias: una es la utilización de estaciones fijas en altura las cuales permiten contabilizar las especies de gran abundancia poblacional (ie. Cisne de Cuello Negro *Cygnus melancoryphus*, Pato Yeco

Phalacrocorax brasilianus, Taguas *Fulica sp*, entre otras). La otra estrategia empleada es la de monitoreos móviles o recorridos, desde un sector a otro, lo cual permite determinar el número de individuos de las especies de menor tamaño y menor abundancia poblacional (Pimpollo *Rollandia rolland*, Picurio *Podilymbus podiceps*, Garza Cuca *Ardea cocoi*, Garza Grande *Casmerodius albus*, Garza Chica *Egretta thula*, Águila Pescadora *Pandion haliaetus*, entre otras), así como también contabilizar la presencia de aquellas especies de mayor abundancia pero que, por las condiciones geográficas del lugar dificultan el registro de las estaciones fijas. Estos recorridos se realizan sistemáticamente en lancha a una velocidad adecuada para no generar la movilidad de las aves hacia otras áreas del Santuario. La metodología descrita para el caso de los Cisnes se viene realizando desde 1982 pero con mejoras sustanciales desde 1987, mientras que para el resto de las aves esto ocurre desde 1999. Dentro del Santuario se encuentran torres de observación que son utilizadas para realizar el censo de Avifauna mensual. Estas torres se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

1.- Torres de observación naturales: Isla Teja, Punucapa, Fundo Altue – sector Pichoy, Fundo Plaza de Armas – sector Pichoy, Locuche – sector Cuyinhue.

2.- Torres de observación fabricadas por Guardafauna: Santa María, Puerto Claro, San Pedro – San Ramón.

El área de prospección abarca la zona propuesta para la protección en el proyecto de reserva del Río Cruces, donde se incluyen las aves presentes en áreas como Cayumapu y Pichoy.

Por otro lado desde noviembre del 2004, debido a los acontecimientos que afectaron al humedal, se han llevado a cabo censos en otras áreas fuera del Santuario con la finalidad de evaluar la movilidad de las aves. Este censo se realiza en 12 sitios con acceso por vía

terrestre y 4 sitios con observación por vía fluvial, lo que suma un total de 16 sitios de conteo fuera del Santuario.

Las actividades anteriormente descritas se realizan en dos días. Un día se desarrolla el conteo total de Cisnes observados en cada uno de los sitios dentro del Santuario del Humedal del Río Cruces junto con el conteo de las otras especies de aves, mientras que el segundo día se realizan los conteos de Cisnes por vía terrestre y fluvial en los sectores fuera del Santuario.

Cisnes de cuello negro dentro del Santuario

El censo efectuado el día 30 de agosto, arroja una abundancia de 1789 ejemplares de **Cisne de cuello negro** (Anexo 1). Esta cifra es inferior a los 1898 ejemplares contabilizados el mes pasado (julio). Al comparar la abundancia con agosto de 2012 (1064 individuos), se verifica un aumento de 725 individuos (Anexo 3). Este mes la mayor concentración de Cisnes en el Santuario se localiza en el sector de San Pedro con 375 individuos (Anexo 1). La figura 1 muestra la evolución del movimiento de abundancia de estas aves desde enero de 1999 a agosto de 2013.




Figura 1. Abundancia de Cisnes de cuello negro desde enero 1999 a agosto de 2013.

Cisnes en áreas fuera del Santuario

El total de ejemplares de **Cisne de cuello negro** censados en las áreas aledañas al Santuario disminuyó con respecto al mes anterior de 337 a 214 individuos contabilizados (Anexo 2). Destaca la presencia de 111 ejemplares registrados en el sector Pichoy.

El número total de ejemplares censados dentro y fuera del Santuario alcanza los 2003 individuos, cifra inferior a la población del mes pasado (2235 individuos). Al comparar la suma de las abundancias de Cisnes dentro y fuera del Santuario con las de agosto de 2012 (1230 individuos), se verifica un aumento de 773 individuos (Figura 2).




Figura 2. Abundancia de Cisnes de cuello negro, dentro y fuera del santuario desde enero 2005 a agosto de 2013.

Taguas

En el caso de las **Taguas** (*Fulica armillata*, *F. leucoptera*, *F. rufifrons*) se observa un leve aumento de individuos respecto al mes pasado de 2463 a 2495 ejemplares. El número de ejemplares es superior respecto a agosto de 2012, para aquella fecha se contabilizaron 873 ejemplares de Taguas.




Figura 3. Abundancia de Taguas desde enero de 1999 a agosto de 2013.

Zambullidores

La **Huala** (*Podiceps major*) presenta una abundancia de 47 individuos, levemente inferior que el mes pasado en que se registraron 50 ejemplares. Con respecto a agosto de 2012, la abundancia se presenta con 42 individuos.

Huala




Figura 4. Abundancia de Huala desde enero de 1999 a agosto de 2013.

Ejemplares de **Picurio** (*Podilymbus podiceps*) Se registraron 8 individuos este mes. En julio pasado se registraron 4, mientras que en agosto de 2012 se contabilizó 1 ejemplar en el Santuario.




Figura 5. Abundancia Picurio desde enero 1999 a agosto de 2013.

Pimpollo (*Rollandia rolland*). Se registran 10 ejemplares el presente mes. Se avistaron 6 ejemplares en el mes pasado. En agosto de 2012 se avistaron 2 individuos en el Santuario.




Figura 6. Abundancia de Pimpollo desde enero de 1999 a agosto de 2013

Garzas

Garza boyera (*Bubulcus ibis*). No se registran individuos el presente mes. El mes pasado se registraron 35 ejemplares. En agosto de 2012 no se contabilizaron ejemplares de Garza boyera en el Santuario.




Figura 7. Abundancia de Garza boyera desde enero de 1999 a agosto de 2013.

Garza chica (*Egretta thula*) Se avistaron 40 ejemplares. En el mes de julio pasado se registraron 47 ejemplares; En agosto de 2012 se registraron 53 individuos.




Figura 8. Abundancia de Garza chica desde enero de 1999 a agosto de 2013.

Garza cuca (*Ardea cocoi*) se avistan 29 individuos este mes, cifra casi similar a los 30 contabilizados en el mes pasado. Esta especie presentó un número de 25 ejemplares contabilizados en agosto de 2012.




Figura 9. Abundancia de Garza cuca desde enero de 1999 a agosto de 2013.

La abundancia de **Garza grande** (*Casmerodius albus*) es de 56 ejemplares; superior que los 50 contabilizados en el mes de julio. En el mes de agosto de 2012 se avistaron 77 ejemplares.




Figura 10. Abundancia de Garza grande desde enero de 1999 a agosto de 2013.

Cormoranes, Bandurrias y Zarapitos

Se contabilizaron 227 individuos de **Cormoranes** (*Phalacrocorax brasilianus*), número superior comparado con el mes de julio donde se registraron 57 ejemplares. Esta cifra es superior a la registrada en agosto de 2012 ya que para esa fecha se contabilizaron 162 ejemplares.




Figura 11. Abundancia de Cormoranes desde enero de 1999 a agosto de 2013.

El presente mes se registraron 37 individuos de **Bandurria** (*Theristicus melanopis*); en el mes de julio no se contabilizaron ejemplares. En agosto de 2012 se registraron 39 individuos en el Santuario.




Figura 12. Abundancia de Bandurria desde enero de 1999 a agosto de 2013.

Durante el presente mes no se avistaron ejemplares de **Zarapito** (*Numenius phaeopus*). El mes pasado tampoco se observaron individuos. En agosto de 2012 no se registraron ejemplares en el Santuario.




Figura 13. Abundancia de Zarapito desde enero de 1999 a agosto de 2013

Gaviota cahuil, Gaviotín piquerito, Trile y Siete colores

La abundancia de **Gaviota cahuil** (*Larus maculipennis*) presentó 55 individuos este mes. En el mes de julio no se registraron ejemplares en el Santuario. Para agosto de 2012 se avistaron 277 individuos.




Figura 14. Abundancia de Gaviota cahuil desde enero de 1999 a agosto de 2013

Gaviotín piquerito (*Sterna trudeaui*) registra 12 individuos para el presente mes. El mes pasado (julio) no se observaron individuos. En agosto de 2012 se registraron 32 individuos dentro del Santuario.




Figura 15. Abundancia de Gaviotín piquerito desde enero de 1999 a agosto de 2013.

Para este mes se registraron 3 individuos de **Trile** (*Agelaius thilius*). En el mes de julio pasado se observaron 6 ejemplares. En agosto de 2012 no se avistaron individuos de Trile en el Santuario.




Figura 16. Abundancia Trile desde enero de 1999 a agosto de 2013.

La abundancia de **Siete colores** (*Tachuris rubrigastra*), registró 11 ejemplares este mes en el Santuario. En el mes de julio se registraron 6 ejemplares. En el mes de agosto de 2012 no se avistaron individuos en el Santuario.




Figura 17. Abundancia Siete colores desde enero de 1999 a agosto de 2013.

Patos

Pato anteojillo (*Speculanans specularis*) se registraron 8 ejemplares en este mes. En el mes anterior (julio) se registraron 7 ejemplares de esta especie. En cuanto a agosto de 2012, se contabilizaron 3 individuos en el Santuario.




Figura 18. Abundancia Pato anteojillo desde enero de 1999 a agosto de 2013.

Se avistaron 16 ejemplares de **Pato jergón** (*Anas georgica, A. flavirostris*) este mes. En julio se registraron 3 individuos. En el mes de agosto de 2012 se registraron 4 ejemplares de esta especie en el Santuario.




Figura 19. Abundancia Pato jergón desde enero de 1999 a agosto de 2013.

Pato negro (*Netta peposaca*) no fue detectado este mes al igual que en los meses precedentes. Solo hubo uno en el mes de enero. Tampoco hubo presencia de la especie en el censo de agosto de 2012. Esta especie dejó de avistarse en el Santuario a partir de junio de 2001.

Pato real (*Anas sibilatrix*) muestra presencia de 27 individuos durante el presente mes. En el mes de julio pasado se registraron 52 individuos. En cuanto a agosto de 2012, se registraron 8 ejemplares en el Santuario.




Figura 20. Abundancia de Pato real desde enero de 1999 a agosto de 2013.

Nidos de cisnes por sector.

N° huevos Por nido	San Ramón	Punucapa	San Pedro	Pto. Claro	Sta. María	San Antonio	Cayumapu	Isla Teja	Lo Cu che	N° Huevos
1										
2										
3	2				3	2		1	1	27
4		2	1	1		1	1	2		32
5		1		2	1	1		1		30
6					1					6
Total										95

Parejas de cisnes con polluelos. Dentro del Santuario

N crías	San Ramón	San Pedro	Pto. Claro	Sta. María	Lo Cu che	Cayu mapu	Cau cau	Punu- capa	El Mo- lino	Isla Teja	N° de pollue- los
1											
2						1					2
3	1	2	2	2	1	3		1	1	2	45
4	1		1			3	1	1		1	32
5				1		2				1	20
6						1					6
Total											105

Parejas de cisnes con polluelos. Fuera del Santuario.

N° crías	Pichoy	San Antonio	Pailapifil	Tambillo	N° polluelos
2		1			2
3	1		1		6
4	1				4
5				1	5
Total					17

Otras observaciones realizadas por los guardafauna

01/08/13 Prospección de Huillín sector El Relleno.. Se observó un visón .

07/08/13 Patrullaje Punucapa La Dehesa, San Pedro , San Ramón. Se captura un visón sector El Relleno. Fue entregado al SAG.

09/08/13 Patrullaje La Dehesa, San Pedro, Punucapa. Se capturó una huiña negra.

12/08/13 Patrullaje Punucapa, Chorocamayo, San Pedro, San Ramón. Se entrega un visón al SAG.

16/08/13 Patrullaje Pto. Claro, Tambillo, San Pedro, Sta. María. Se observan nidos de cisnes y parejas con crías. En Pto. Claro cinco parejas de garza cuca en el nido. En sector Santa María hay una colonia de garza grande en sus nidos.

23/08/13 Patrullaje sectores Punucapa, Frutillar, Pte. Cruces Cau-Cau El Molino. Se observan dos parejas de cisnes con polluelos.

26/08/13 Prospección de huillín sector El Relleno. Se capturó un visón en Isla Huape y otro en el Relleno. Fueron entregados al SAG.

Especie	Sector 1		Sector 2	Sector 3		Sector 4				Otros sectores				Total		
	El Molino	Punu-capá	San Ramón	San Pedro	Puerto Claro	Santa María	San Martín	Bella-vista	Fuerte San Luis	Locu-che	Cuyin-hue	Isla Teja	Cayu-mapu		San Antonio	Río Pichoy
Cormorán o Yeco		15			185		10		17							227
Águila Pescadora																-
Bandurria					12		10		15							37
Becacina																-
Cisne Coscoroba																-
Cisne Cuello Negro	8	275	30	375	87	102	10	262	51	2	2	149	31	131	274	1.789
Cuervo del pantano																-
Garza Boyera																-
Garza Chica		8			18		7		7							40
Garza Cuca		6			14		5		4							29
Garza Grande		5			35		8		8							56
Gaviota Cahuil		26			13		10		6							55
Gaviotín Piquerito		8			3		1									12
Gaviota Dominicana		6			4		2									12
Huairavillo		1														1
Huairavo																-
Huala		10			14		10		13							47
Martín Pescador																-
Pato Anteojillo									8							8
Pato Jergón							6		10							16
Pato negro																-
Pato Real							15		12							27
Pelícano		2			3		2									7
Picurio		5			2		1									8
Pidén																-
Pimpollo		6			4											10
Queltehue		9			7		5		4							25
Run Run																-
Siete Colores		4			3		4									11
Tagua		510			1.900		70		15							2.495
Tagüita																-
Tiuque		8			6		4		5							23
Traro		4			1		2		3							10
Trile		3														3
Zarapito																-

ANEXO 2		Valores de abundancia del Cisne de cuello negro dentro y fuera del Santuario del río Cruces.		
AÑO	MES	Abundancia dentro	Abundancia fuera	Suma de abundancias
2002	N	5.030		
	D	5.328		
2003	E	5.664		
	F	6.044		
	M	6.280		
	A	6.364		
	M	5.795		
	J	5.391		
	J	6.047		
	A	5.941		
	S	5.598		
	O	5.171		
	N	4.935		
	D	5.458		
	E	5.932		
	F	6.266		
2004	M	6.483		
	A	7.997		
	M	7.983		
	J	6.512		
	J	5.388		
	A	3.411		
	S	3.674		
	O	2.180		
	N	2.942		
	D	2.324	1.100	3.424
	E	942	1.907	2.849
	F	289	2.282	2.571
	M	570	2.018	2.588
	A	866	1.219	2.085
M	518	288	806	
J	476	303	779	
J	290	243	533	
A	249	150	399	
S	398	295	693	
O	689	229	918	
N	680	315	995	
D	668	168	836	
2005	E	436	536	972
	F	1.028	562	1.590
	M	803	402	1.205
	A	819	124	943
	M	366	543	909
	J	304	625	929
	J	253	238	491
	A	401	224	625
	S	670	285	955
	O	654	466	1.120
	N	601	925	1.526
	D	372	501	873
	E	386	543	929
	F	252	370	622
M	547	510	1.057	
A	616	474	1.090	
M	379	530	909	
J	383	701	1.084	
J	297	744	1.041	
A	542	426	968	
S	806	689	1.495	
O	907	501	1.408	
N	877	658	1.535	
D	251	392	643	

2008	F	214	276	490	
	M	360	1.398	1.758	
	A	352	1.720	2.072	
	M	371	1.131	1.502	
	J	249	942	1.191	
	J	272	714	986	
	A	252	431	683	
	S	869	338	1.207	
	O	972	563	1.535	
	N	1084	443	1.527	
	D	1376	349	1.725	
	E	698	1326	2.024	
	F	613	1289	1.902	
	M	166	2801	2.967	
2009	A	90	4630	4.720	
	M	111	2882	2.993	
	J	158	1251	1.409	
	J	283	642	925	
	A	296	685	981	
	S	668	472	1.140	
	O	445	620	1.065	
	N	444	675	1.119	
	D	581	567	1.148	
	E	922	380	1.302	
	F	972	274	1.246	
	M	637	898	1.535	
	A	352	754	1.106	
	M	270	608	878	
J	222	518	740		
J	568	801	1.369		
A	241	533	774		
S	326	352	678		
O	407	532	939		
N	626	145	771		
D	593	790	1.383		
2010	E	668	726	1.394	
	F	180	1165	1.345	
	M	101	1416	1.517	
	A	165	1782	1.947	
	M	200	1995	2.195	
	J	627	1178	1.805	
	J	466	564	1.030	
	A	327	353	680	
	S	607	293	900	
	O	730	190	920	
	N	753	198	951	
	D	516	223	739	
	E	1798	241	2.039	
	F	2176	336	2.512	
M	1039	854	1.893		
A	1311	1005	2.316		
M	790	1155	1.945		
J	644	850	1.494		
J	1246	473	1.719		
A	1064	166	1.230		
S	1220	293	1.513		
O	1197	114	1.311		
N	2014	100	2.114		
D	1428	196	1.624		
2011	E	1699	277	1.976	
	F	1519	733	2.252	
	M	1833	815	2.648	
	A	1430	932	2.362	
	M	1606	1594	3.200	
	J	1442	1065	2.507	
	J	1898	337	2.235	
	A	1789	214	2.003	
	S				
	O				
	N				
	D				
	2012	E			
		F			
M					
A					
M					
J					
J					
A					
S					
O					
N					
D					
2013		E			
		F			
	M				
	A				
	M				
	J				
	J				
	A				
	S				
	O				
	N				
	D				

Anexo 3. Abundancia mes a mes y Promedio anual de la especie Cisne de cuello negro.													
Santuario del Río Cruces													
MESES DEL AÑO												Promedio	
Años	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiemb	Octubre	Noviemb	Diciemb	Mensual
2000	5.093	7.998	6.923	6.867	6.943	6.313	3.438	4.897	5.010	5.002	4.532	4.623	5.637
2001	5.997	5.502	5.881	5.654	1.729	5.421	5.654	4.712	3.648	4.225	4.365	4.421	4.767
2002	5.537	6.029	6.359	6.666	6.160	6.292	5.572	5.816	5.752	4.783	5.030	5.328	5.777
2003	5.664	6.044	6.280	6.364	5.795	5.391	6.047	5.941	5.598	5.171	4.935	5.458	5.724
2004	5.932	6.266	6.483	7.997	7.983	6.512	5.388	3.411	3.674	2.180	2.942	2.324	5.091
2005	942	289	570	866	518	476	290	249	398	689	680	668	553
2006	436	1.028	803	819	366	304	253	401	670	654	601	372	559
2007	386	252	547	616	379	383	297	542	806	907	877	251	520
2008	311	214	360	352	371	249	272	252	869	972	1.084	1.376	557
2009	698	613	166	90	111	158	283	296	668	445	444	581	379
2010	922	972	637	352	270	222	568	241	326	407	626	593	511
2011	668	180	101	165	200	627	466	327	607	730	753	516	445
2012	1.798	2.176	1.039	1.311	790	644	1.246	1.064	1.220	1.197	2.014	1.428	1.327
2013	1.699	1.519	1.833	1.430	1.606	1.442	1.898	1.789					1.652