

Santuario de la Naturaleza
Río Cruces y Chorocamayo
Sitio Ramsar Carlos Anwandter



Informe

Monitoreo de Fauna

MARZO 2017

Oficina Provincial Valdivia





CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

Región de Los Ríos
Oficina Provincial Valdivia



Santuario de la Naturaleza
Río Cruces y Chorocamayo

Sitio Ramsar
Carlos Anwandter

Equipo Monitoreo Avifauna

GP. Sr. Luis Miranda Herrera
GP. Sr. Roberto Rosas Mena
GP. Sr. Luis Thon Jara
GP. Sr. Mario Maturana Arévalo
GP (t) Sr. Juan Pablo Morales

Portada: aves en el río Cruces.

Fotografía: Juan Pablo Morales.

(Se permite el uso de la información sin fines comerciales mencionando la fuente de origen).

Índice

1. Resumen	3
2. Introducción	4
3. Metodología	6
4. Resultados	9
4.1 Cisne cuello negro	9
4.1.1 Dentro del Santuario	9
4.1.2 Fuera del Santuario	10
4.1.3 Dentro y fuera del Santuario	10
4.2 Taguas	11
4.3 Huala	12
4.4 Picurio	13
4.5 Pimpollo	14
4.6 Garza boyera	15
4.7 Garza chica	16
4.8 Garza cuca	17
4.9 Garza grande	18
4.10 Cormorán, yeco	19
4.11 Bandurria	20
4.12 Zarapito	21
4.13 Gaviota cáhuil	22
4.14 Gaviotín piquerito	23
4.15 Trile	24
4.16 Siete colores	25
4.17 Pato anteojillo	26
4.18 Pato jergón	27
4.19 Pato negro	28
4.20 Pato real	29
5 Anexos	
5.1 Resultados del censo al interior del SNCA (marzo 2017)	30
5.2 Valores de abundancia noviembre 2002 – marzo 2017	31
5.3 Abundancia mensual y promedio anual de cisne de cuello negro en SNCA enero 2000 – marzo 2017	35
5.4 Algunas observaciones realizadas por guardaparques	36

1. Resumen

Se entregan los resultados del censo de avifauna realizado en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter durante el mes de marzo de 2017.

La riqueza de avifauna fue de 24 especies.

La totalidad de cisnes contabilizados dentro y fuera del SNCA fue de 9.763 ejemplares, mayor número respecto a febrero pasado donde se observaron 7.550 ejemplares (Anexo 5.2).

El conteo de cisnes en el censo interno fue de 8.431 ejemplares (Anexo 5.1), correspondiendo un 95,6% a adultos y un 4,4% a juveniles. La mayoría de los cisnes de cuello negro se localizan en el sector de Santa María (3.195).

En el censo externo realizado en áreas aledañas al Santuario, se contabilizaron 1.332 cisnes, observándose la mayor concentración de ejemplares en Guacamayo (660). Del total, todos corresponden a ejemplares adultos.

2. Introducción

Inserto en el Humedal del Río Cruces se encuentra el Santuario de la Naturaleza e Investigación Científica “Carlos Anwandter” (SNCA), creado por D.S. N° 2734 del 3 de junio de 1981. Esta categoría de protección está establecida en la Ley de Monumentos Nacionales de 1968.

Comprende una superficie de 4.892,22 ha, ubicado en las comunas de Mariquina y Valdivia, Región de los Ríos, sur de Chile (mapa 1). El origen del humedal está en el descenso de los terrenos asociados a los cursos de agua y su posterior inundación como consecuencia del terremoto de mayo de 1960 que afectó al sur de Chile.

EL SNCA es importante por la biodiversidad que contiene (más de 20 especies de mamíferos y 119 de aves), la protección que otorga a especies con problemas de conservación (e.g. *Lontra provocax*, *Cygnus melancoryphus*), la relevancia paisajística, turística, y por sus servicios ecosistémicos derivados de sus funciones y atributos.¹

El 27 de julio de 1981 fue designado primer sitio Ramsar de Chile al área sumergida asociada al río Cruces. La extensión territorial del sitio incluye el lecho del río, bañados, bosques pantanosos y humedales palustres. Por estar bajo la categoría de protección de Santuario de la Naturaleza, no se permite la extracción de recursos naturales dentro de sus márgenes².

El presente informe tiene por propósito difundir las estadísticas del monitoreo permanente que Conaf realiza en SNCA, utilizando censos para su conteo, correspondientes al mes de marzo de 2017. Esta información es recabada mensualmente por los guardaparques del Santuario.

Las estadísticas para un conjunto de aves del Santuario (Humedal del Río Cruces) se entregan en los anexos y para grupos selectos de aves se presentan gráficos desde enero de 1999 a la fecha.

¹ (Muñoz-Pedrerros et al. 1993, Muñoz-Pedrerros 2003).

² Ficha Ramsar.



La metodología empleada se basa en conteos visuales en movimiento (vía acuática mediante lanchas y vía terrestre en vehículo para acceder a puntos de observación fuera del Santuario) y estaciones terrestres ubicadas en posiciones estratégicas para el avistamiento de aves dentro del humedal.

3. Metodología

Los conteos (censos) periódicos de la avifauna al interior del SNCA - Humedal del Río Cruces se realizan periódicamente en base a dos métodos:


- a) Una es la utilización de estaciones de punto fijo en altura los cuales permiten contabilizar las especies de mayor tamaño (e.g. cisne de cuello negro *Cygnus melancoryphus*, pato yeco *Phalacrocorax brasilianus*, taguas *Fulica sp*, entre otras).
- b) La otra metodología es la de conteos desde una embarcación con *tracks* (recorridos) de navegación determinados. Este método permite determinar el número de individuos de las especies de menor tamaño y menor abundancia poblacional (e.g. pimpollo *Rollandia rolland*, picurio *Podilymbus podiceps*, garza cuca *Ardea cocoi*, garza grande *Casmerodius albus*, garza chica *Egretta thula*, águila pescadora *Pandion haliaetus*, entre otras), así como también contabilizar la presencia de aquellas especies de mayor abundancia pero que, por las condiciones geográficas del lugar dificultan el registro de las estaciones fijas. Estos recorridos se realizan sistemáticamente en lancha a una velocidad adecuada para no generar la movilidad de las aves hacia otras áreas del Santuario. La metodología descrita para el caso de los cisnes se viene realizando desde 1982, pero con mejoras sustanciales desde 1987, mientras que para el resto de las aves esto ocurre desde 1999.

Dentro del SNCA se encuentran 16 puntos de observación que son utilizados para realizar el censo de avifauna mensual, de los cuales 9 puntos de observación consideran miradores naturales y que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: Isla Teja, Frutillar, Punucapa, San Pedro, San Ramón, Fundo Altue, Fundo Plaza de Armas, Locuche y Cuyinhue.

El área de prospección abarca la zona propuesta para la protección en el proyecto de creación de la Reserva Nacional Río Cruces, donde se incluyen las aves presentes en áreas como Cayumapu y Pichoy.

Desde noviembre del 2004, debido a los acontecimientos que afectaron al humedal (funcionamiento de una planta de celulosa), se han llevado a cabo censos en otras áreas fuera del santuario como Guacamayo, Pichoy, San Antonio y Pailapifil, con la finalidad de evaluar la movilidad de las aves. Este censo externo que en su momento llegó a 11 sitios, actualmente considera 4 sitios: 3 por vía terrestre y 1 sitio con observación por vía fluvial.

Las actividades anteriormente descritas se realizan en dos días. Un día se desarrolla el conteo total de cisnes observados en cada uno de los sitios dentro del SNCA-Humedal del Río Cruces junto con el conteo de las otras especies de aves, mientras que el segundo día se realizan los conteos de cisnes por vía terrestre y fluvial en los sectores fuera del Santuario.



Mapa 1: Censos internos y externos en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, Región de Los Ríos.

(Fuente: DASP, Conaf Región de Los Ríos).

4. Resultados

4.1 Cisne de cuello negro

(Cygnus melancoryphus)

Se entrega la información recopilada tanto dentro y fuera del SNCA y un consolidado de ambas.

4.1.1 Dentro del Santuario.

El censo efectuado el día 30 de marzo de 2017 arroja una abundancia de 8.431 ejemplares (Anexo 5.1), de los cuales un 95,6% corresponde a adultos (8.060) y un 4,4% a juveniles (371). Esta cifra es mayor a los 6.517 ejemplares contabilizados en febrero pasado. Al comparar la abundancia con marzo de 2016, que registró 5.889 individuos, se verifica un aumento en la población (Anexo 5.2). Este mes la mayor concentración de cisnes en el SNCA se localiza en el sector de Santa María con 3.195 individuos (Anexo 5.1). La figura 1 muestra abundancias mensuales de *C. melancoryphus* desde enero de 1999 a marzo 2017.




Figura 1. Abundancia de cisnes de cuello negro enero 1999 – marzo 2017.

4.1.2 Fuera del Santuario.

El total de ejemplares de cisne de cuello negro censados en las áreas aledañas al SNCA fue de 1.332 ejemplares, solo adultos. Esta cifra es superior al mes pasado (Anexo 5.2).

La mayor cantidad de ejemplares se localizó en Guacamayo.

4.1.3 Dentro y fuera del Santuario.

El número total de ejemplares censados dentro y fuera del SNCA alcanzó a 9.763, cifra mayor a la población de febrero pasado (7.550). Al comparar la suma de las abundancias de cisnes dentro y fuera del Santuario con las de marzo de 2016 (6.817 individuos), se verifica un claro aumento de ejemplares (Figura 2).




Figura 2. Abundancia de cisnes de cuello negro, dentro y fuera del Santuario de la Naturaleza enero 2006 – marzo 2017.

4.2 Taguas

(*Fulica armillata*, *F. leucoptera*, *F. rufifrons*)

Se registraron 663 ejemplares de tagua en este mes.

El mes pasado se avistaron 173 ejemplares.

El número de individuos es mayor respecto a marzo de 2016, donde se contabilizaron 490 ejemplares.




Figura 3. Abundancia de taguas enero 1999 – marzo 2017.

Zambullidores

4.3 Huala

(Podiceps major)

Se contabilizaron 42 individuos, número mayor al mes pasado (41). En marzo de 2016 la abundancia fue de 41 individuos.




Figura 4. Abundancia de huala enero 1999 – marzo 2017.

4.4 Picurio

(*Podilymbus podiceps*)

Se observó 1 ejemplar este mes mientras que en febrero pasado no se observaron ejemplares.

En marzo de 2016 se contabilizaron 6 ejemplares.




Figura 5. Abundancia de picurio enero 1999 – marzo 2017.

4.5 Pimpollo

(*Rollandia rolland*).

Se registran 7 ejemplares el presente mes, mientras que en febrero pasado 2. En marzo de 2016 se observaron 38 individuos.




Figura 6. Abundancia de pimpollo enero 1999 – marzo 2017.

4.7 Garza chica

(*Egretta thula*)

Se avistaron 83 ejemplares este mes. En febrero pasado se registraron 47. En marzo de 2016 se observaron 36 individuos.




Figura 8. Abundancia de garza chica enero 1999 – marzo 2017.

4.8 Garza cuca

(*Ardea cocoi*)

Se registran 39 ejemplares este mes, cifra inferior a los 45 contabilizados en el mes pasado. Esta especie registró un número de 40 ejemplares en marzo de 2016.




Figura 9. Abundancia de garza cuca desde enero de 1999 – marzo de 2017.

4.9 Garza grande

(*Ardea alba*)

La abundancia de garza grande registró 24 ejemplares este mes, inferior a los 31 contabilizados en febrero pasado. En el mes de marzo de 2016 se avistaron 34 ejemplares.




Figura 10. Abundancia de garza grande enero de 1999 – marzo de 2017.

Cormoranes, Bandurrias y Zarapitos

4.10 Cormorán yeco

(Phalacrocorax brasilianus)

Se contabilizaron 57 individuos de cormoranes yeco, número menor al observado el mes pasado donde se registraron 172 ejemplares. En marzo de 2016 se contabilizaron 182 yecos.




Figura 11. Abundancia de cormoranes enero 1999 – marzo 2017.

4.11 Bandurria

(*Theristicus melanopis*)

En el presente mes se observaron 18 individuos. En febrero pasado no se observaron ejemplares. En marzo de 2016 tampoco se observaron ejemplares.




Figura 12. Abundancia de bandurria enero 1999 – marzo 2017.

4.12 Zarapito

(*Numenius phaeopus*)

Durante el presente no se contabilizaron ejemplares, mientras que en febrero pasado se avistaron 7 ejemplares. En marzo de 2016 no se observaron ejemplares.




Figura 13. Abundancia de zarapito enero 1999 – marzo 2017.

Gaviota cáhuil, Gaviotín piquerito, Trile y Siete colores

4.13 Gaviota cáhuil

(*Chroicocephalus maculipennis*)

La abundancia de esta especie fue de 19 individuos este mes. En el mes de febrero pasado se registraron 124 ejemplares. Para marzo de 2016 se registraron 26 individuos.




Figura 14. Abundancia de gaviota cáhuil enero 1999 – marzo 2017.

4.14 Gaviotín piquerito

(*Sterna trudeaui*)

Gaviotín piquerito no registra individuos para el presente mes mientras que en febrero pasado se observaron 6 ejemplares. En marzo de 2016 no se observaron individuos dentro del Santuario.




Figura 15. Abundancia de gaviotín piquerito enero 1999 – marzo 2017.

4.15 Trile

(Agelasticus thilius)

Se registraron 4 individuos de trile este mes, al igual que en febrero pasado. En marzo de 2016 no se avistaron individuos.




Figura 16. Abundancia de trile enero 1999 – marzo 2017.

4.16 Siete colores

(*Tachuris rubrigastra*)

Se registraron 9 ejemplares este mes. En febrero pasado se contabilizaron 11 ejemplares. En marzo de 2016 fueron 4 los ejemplares contabilizados.




Figura 17. Abundancia siete colores enero 1999 – marzo 2017.

Patos

4.17 Pato anteojillo

(*Specularnas specularis*)

No se registraron ejemplares este mes al igual que en febrero pasado. En marzo de 2016, 2 ejemplares fueron registrados.




Figura 18. Abundancia de pato anteojillo desde enero de 1999 – marzo 2017.

4.18 Pato jergón

(*Anas georgica*, *A. flavirostris*)

Este mes se registraron 166 individuos, cifra mayor al mes pasado donde se observaron 120 ejemplares. En marzo de 2016 se registraron 321 ejemplares.




Figura 19. Abundancia pato jergón enero 1999 – marzo 2017.

4.19 Pato negro

(*Netta peposaca*)

En este mes no se registraron ejemplares, al igual que febrero pasado. En marzo de 2016 no se avistaron ejemplares.




Figura 20. Abundancia de pato negro enero 1999 – marzo 2017.

4.20 Pato real

(*Anas sibilatrix*)

Se registraron 559 individuos durante el presente mes, cifra mayor a los 133 contabilizados en febrero pasado. En marzo de 2016, se observaron 221 ejemplares.




Figura 21. Abundancia de pato real enero 1999 – marzo 2017.

ANEXOS

Anexo 5.1 Resultados del censo al interior del Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo Sitio Ramsar Carlos Anwandter (marzo 2017).

ESPECIE	Sector 1				Sector 2	Sector 3			Sector 4				Otros sectores			TOTAL
	El Molino	Punucapa	San Ramón	San Pedro	Puerto Claro	Santa María	San Martín	Bellavista	Fuerte San Luis	Locuche	Cuyinhue	Isla Teja	Cayumapu	San Antonio	Río Pichoy	
Águila Pescadora					1											1
Bandurria					8		10									18
Becacina																0
Cisne Coscoroba																0
Cisne Cuello Negro	210	980	71	370	2.394	3.100	185	173	145			38	15	259	120	8.060
Cisne Juvenil	6	85	8	52	110	95		15								371
Cormorán o Yeco		9			27		9		12							57
Cuervo del pantano																0
Garza Boyera					3		2									5
Garza Chica		3			9		67		4							83
Garza Cuca		7			11		15		6							39
Garza Grande		5			5		6		8							24
Gaviota Cahuil		7			3		5		4							19
Gaviotín Piquerito																0
Gaviota Dominicana		4			2		6									12
Huairavillo		1														1
Huairavo																0
Huala		10			13		8		11							42
Martín Pescador		1														1
Pato Anteojillo																0
Pato Jergón		72			56		20		18							166
Pato negro																0
Pato Real		94			80		270		115							559
Pelícano																0
Picurio		1														1
Pidén																0
Pimpollo					7											7
Queltehue		8			4		35		6							53
Run Run																0
Siete Colores		4			5											9
Tagua		63			220		335		15							633
Tagüita							1									1
Tiuque		3			6		8		2							19
Traro					2		4		1							7
Trile		4														4
Zarapito																0

Anexo 5.2 Valores de abundancia mensual noviembre 2002 – marzo 2017.

AÑO	MES	Abundancia dentro	Abundancia fuera	Suma de abundancias
2002	N	5.030		
	D	5.328		
2003	E	5.664		
	F	6.044		
	M	6.280		
	A	6.364		
	M	5.795		
	J	5.391		
	J	6.047		
	A	5.941		
	S	5.598		
	O	5.171		
	N	4.935		
	D	5.458		
2004	E	5.932		
	F	6.266		
	M	6.483		
	A	7.997		
	M	7.983		
	J	6.512		
	J	5.388		
	A	3.411		
	S	3.674		
	O	2.180		
	N	2.942		
	D	2.324	1.100	3.424
2005	E	942	1.907	2.849
	F	289	2.282	2.571
	M	570	2.018	2.588
	A	866	1.219	2.085
	M	518	288	806
	J	476	303	779
	J	290	243	533
	A	249	150	399
	S	398	295	693
	O	689	229	918
	N	680	315	995
	D	668	168	836
2006	E	436	536	972
	F	1.028	562	1.590
	M	803	402	1.205
	A	819	124	943
	M	366	543	909
	J	304	625	929

	J	253	238	491
	A	401	224	625
	S	670	285	955
	O	654	466	1.120
	N	601	925	1.526
	D	372	501	873
2007	E	386	543	929
	F	252	370	622
	M	547	510	1.057
	A	616	474	1.090
	M	379	530	909
	J	383	701	1.084
	J	297	744	1.041
	A	542	426	968
	S	806	689	1.495
	O	907	501	1.408
	N	877	658	1.535
	D	251	392	643
2008	F	214	276	490
	M	360	1.398	1.758
	A	352	1.720	2.072
	M	371	1.131	1.502
	J	249	942	1.191
	J	272	714	986
	A	252	431	683
	S	869	338	1.207
	O	972	563	1.535
	N	1.084	443	1.527
	D	1.376	349	1.725
2009	E	698	1.326	2.024
	F	613	1.289	1.902
	M	166	2.801	2.967
	A	90	4.630	4.720
	M	111	2.882	2.993
	J	158	1.251	1.409
	J	283	642	925
	A	296	685	981
	S	668	472	1.140
	O	445	620	1.065
	N	444	675	1.119
	D	581	567	1.148
2010	E	922	380	1.302
	F	972	274	1.246
	M	637	898	1.535
	A	352	754	1.106
	M	270	608	878
	J	222	518	740
	J	568	801	1.369

	A	241	533	774
	S	326	352	678
	O	407	532	939
	N	626	145	771
	D	593	790	1.383
2011	E	668	726	1.394
	F	180	1.165	1.345
	M	101	1.416	1.517
	A	165	1.782	1.947
	M	200	1.995	2.195
	J	627	1.178	1.805
	J	466	564	1.030
	A	327	353	680
	S	607	293	900
	O	730	190	920
	N	753	198	951
	D	516	223	739
2012	E	1.798	241	2.039
	F	2.176	336	2.512
	M	1.039	854	1.893
	A	1.311	1.005	2.316
	M	790	1.155	1.945
	J	644	850	1.494
	J	1.246	473	1.719
	A	1.064	166	1.230
	S	1.220	293	1.513
	O	1.197	114	1.311
	N	2.014	100	2.114
	D	1.428	196	1.624
2013	E	1.699	277	1.976
	F	1.519	733	2.252
	M	1.833	815	2.648
	A	1.430	932	2.362
	M	1.606	1.594	3.200
	J	1.442	1.065	2.507
	J	1.898	337	2.235
	A	1.789	214	2.003
	S	1.556	269	1.825
	O	1.897	162	2.059
	N	1.949	163	2.112
	D	2.816	280	3.096
2014	E	2.323	692	3.015
	F	3.062	930	3.992
	M	3.524	1.315	4.839
	A	2.821	957	3.778
	M	3.632	659	4.291
	J	3.426	799	4.225
	J	3.210	216	3.426




	A	3.498	400	3.898
	S	3.369	447	3.816
	O	2.766	325	3.091
	N	2.308	479	2.787
	D	2.958	372	3.330
2015	E	2.764	435	3.199
	F	3.121	680	3.801
	M	4.053	918	4.971
	A	3.794	540	4.334
	M	3.692	757	4.449
	J	3.650	584	4.234
	J	4.395	624	5.019
	A	3.598	274	3.872
	S	3.208	327	3.535
	O	3.396	299	3.695
	N	2.151	165	2.316
	D	2.251	293	2.544
2016	E	3.820	259	4.079
	F	3.297	385	3.682
	M	5.889	928	6.817
	A	6.815	1.241	8.056
	M	8.435	992	9.427
	J	6.238	800	7.038
	J	5.686	729	6.415
	A	4.347	698	5.045
	S	4.563	871	5.434
	O	5.324	675	5.999
	N	5.770	625	6.395
	D	6.632	771	7.403
2017	E	6.692	769	7.461
	F	6.517	1.033	7.550
	M	8.431	1332	9.763

Anexo 5.3 Abundancia mensual y promedio anual de cisne de cuello negro en Santuario de la Naturaleza Río Cruces y Chorocamayo, Sitio Ramsar Carlos Anwandter, enero 2000 – marzo 2017.

Años	MESES DEL AÑO												Promedio
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiemb	Octubre	Noviemb	Diciemb	
2000	5.093	7.998	6.923	6.867	6.943	6.313	3.438	4.897	5.010	5.002	4.532	4.623	5.637
2001	5.997	5.502	5.881	5.654	1.729	5.421	5.654	4.712	3.648	4.225	4.365	4.421	4.767
2002	5.537	6.029	6.359	6.666	6.160	6.292	5.572	5.816	5.752	4.783	5.030	5.328	5.777
2003	5.664	6.044	6.280	6.364	5.795	5.391	6.047	5.941	5.598	5.171	4.935	5.458	5.724
2004	5.932	6.266	6.483	7.997	7.983	6.512	5.388	3.411	3.674	2.180	2.942	2.324	5.091
2005	942	289	570	866	518	476	290	249	398	689	680	668	553
2006	436	1.028	803	819	366	304	253	401	670	654	601	372	559
2007	386	252	547	616	379	383	297	542	806	907	877	251	520
2008	311	214	360	352	801	249	272	252	869	972	1.084	1.376	593
2009	698	613	166	90	111	158	283	296	668	445	444	581	379
2010	922	972	637	352	270	222	568	241	326	407	626	593	511
2011	668	180	101	165	200	627	466	327	607	730	753	516	445
2012	1.798	2.176	1.039	1.311	790	644	1.246	1.064	1.220	1.197	2.014	1.428	1.327
2013	1.699	1.519	1.833	1.430	1.606	1.442	1.898	1.789	1.556	1.897	1.949	2.816	1.786
2014	2.323	3.062	3.524	2.821	3.632	3.426	3.210	3.498	3.369	2.766	2.308	2.958	3.075
2015	2.764	3.121	4.053	3.794	3.692	3.650	4.395	3.598	3.208	3.396	2.151	2.251	3.339
2016	3.820	3.297	5.889	6.815	8.435	6.238	5.686	4.347	4.563	5.324	5.770	6.632	5.568
2017	6.692	6.517	8.431										7.213

Anexo 5.4 Algunas observaciones realizadas por guardaparques.

1 de marzo	Prospección del huillín en sectores El Relleno, Punucapa, San Ramón. Se observa un ejemplar en la ribera del río Cruces.
7 de marzo	Patrullaje en sectores Isla Huape, Puerto Claro, Santa María, San Antonio, Altue, San Martín, Bellavista, Fuerte San Luis. Se observa un aumento en la población de cisnes y taguas.
11 de marzo	Patrullaje en sectores, Punucapa, Frutillar y El Molino. Se controla kayak.
29 de marzo	Se realiza censo externo.
30 de marzo	Se realiza censo interno. Se observa una tagüita común.



Santuario de la Naturaleza
Río Cruces y Chorocamayo



Sitio Ramsar
Carlos Anwandter

